TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
CƠ SỞ ÂN THI
Số: 12 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ân Thi, ngày 12 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH BẢO VỆ THỰC VẬT TỪ NGÀY 5/5 ĐẾN 12/5/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 20-30^{0}C

Độ ẩm trung bình: 70 - 80 %.

Tuần qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, ngày trời nắng nóng, đêm và sáng xen kẽ có mưa rào và giông. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Kế hoạch gieo cấy toàn khu vực là 6.300 ha.

GĐST: Trỗ thoát - Chắc xanh - Đỏ đuôi.

Cây nhãn, vải: Phát triển quả - Thu hoạch.

Cây có múi: Phát triển quả.

II. TÌNH HÌNH BVTV 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Bệnh đạo ôn cổ bông có xu hướng phát sinh, phát triển mạnh trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp 415, Nếp 9603, Q5, Khang Dân 18 và một số giống lúa khác….Tỷ lệ hại phổ biến: 0,3-0,5% số bông, nơi cao 1-2% số bông, cá biệt 5-7% số bông. Trong tuần qua, nông dân đã tích cực phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm ở những diện tích dòng già thấp tho trỗ dạt kết quả tốt.

- Bệnh khô vằn phát triển mạnh trên các trà lúa. Bệnh hại nặng trên các chân ruộng cấy dày, cạn nước, bón phân không cân đối NPK… Tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số dảnh, nơi cao 7-15% số dảnh, cá biệt >40% số dảnh. Cấp 1-3-5-7.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện và phát triển trên các giống lúa nhiễm như: Lúa lai, Bắc thơm số 7… sau những trận mưa giông. Tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, nơi cao 7-15 % số lá, CB >30% số lá. Cấp 1-3-5.

- Sâu cuốn lá nhỏ nở rộ và gây hại rải rác trên một số diện tích lúa muộn, ruộng xanh tốt gần đường giao thông. Mật độ phổ biến: 5-10 con/m^2 , nơi cao >20 con/m^2.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng đang gia tăng về mật độ trên các giống lúa nhiễm. Mật độ phổ biến 50 -100con/m^2. Nơi cao 500 – 700 con/m^2, Cá biệt >1.000. Tuổi TT,1,2. Mật độ trứng phổ biến: 30-50 ổ/m^2, nơi cao 70-80 ổ/m^2, cá biệt >100 ổ/m^2.

- Chuột gây hại gia tăng trên một số diện tích đặc biệt khu ruộng chân cao, ven làng, gần gờ đống kênh mương… Tỷ lệ phổ biến 0,5-1% số dảnh, nơi cao 3-5% số dảnh, cá biệt >10% số dảnh.

Được quét bằng CamScanner

- Ngoài ra sâu dục thân, bệnh thối thân, thối dảnh, vàng lá… gây hại rải rác trên các trà lúa.

2. Trên cây nhãn vải, cây có múi

- Trên cây nhãn vải: Nhện, bọ xít nâu, rầy chổng cánh, bệnh sương mai, thán thư … gây hại cục bộ trên một số diện tích.
- Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội gây hại rải rác mật độ thấp.

III/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa:

- Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh, phát triển trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp, Khang Dân 18, Q5, TBR225…. Chú ý, những diện tích lúa đang trỗ và chắc xanh cần chủ động phòng trừ bệnh đạo cổ bông. Nếu không chủ động phun phòng trừ bệnh sẽ gây hại làm trắng cổ bông, cổ gié… giảm năng suất lúa.
- Bệnh khô vằn, đen lép hạt tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên các trà lúa đặc biệt trên các chân ruộng bón phân không cân đối, bón nặng đạm.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát triển trên các giống lúa nhiễm sau những trận mưa giông.
- Sâu cuốn lá nhỏ sâu non tiếp tục nở rộ và gây hại trên một số diện tích lúa muộn, ruộng xanh tốt, ven làng, gần đường giao thông.
- Sâu đục thân tiếp tục gây hại trên một số diện tích lúa muộn.
- Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gia tăng về mật độ và phạm vi gây hại trên các giống lúa nhiễm.
- Chuột gây tiếp tục gây hại gia tăng trên một số diện tích lúa giai đoạn đứng cái làm đòng.

2. Trên cây nhãn vải và cây có múi

- Trên cây nhãn vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu gây hại cục bộ, bệnh sương mai, thán thư tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích.
- Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa:

Tăng cường kiểm tra ruộng, vườn theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng.

- Tiếp tục phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Ban kan 600 WP, Kenedy 75 WP, Dojione 40 EC, Filia 525 SC … Lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn.
- Phun phòng trừ bệnh khô vằn, đen lép hạt bằng các thuốc như: Anvil 5SC, Tilsuper 300EC, Nevo 330EC…
- Phun phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cho các giống lúa nhiễm bằng thuốc đặc hiệu như: Ychatot 900SP, Totan 200WP, Xantocin 40WP, Xanthomix 20 WP...Sau những trận mưa giông.

Được quét bằng CamScanner

- Chủ động phun trừ sâu dục thân hai chấm ở những diện tích lúa đang thấp tho trỗ và sau khi lúa trỗ thoát hoàn toàn, ở nơi có mật độ trứng > 0,3 ổ/m^2 bằng các thuốc đặc hiệu như: Vitaco 40 WG, Voliam targo 063 SC, DuPonnt Prevathon 5 SC. Chú ý diện tích lúa muộn.

- Rẽ lúa kiểm tra mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng và phun trừ kịp thời ở những nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Afta 300WG…

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ ở diện tích lúa muộn, ruộng xanh tốt, có hiện tượng bướm dồn cần chủ động kiểm tra và phun trừ ở những nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Incipio 200 SC, Dylan 5 WG, Comdagold 5WG, Vitako 40 WG, Voliam targo 063 SC, SoLo 350 SC... Chú ý: chỉ phun ở những nơi có mật độ cao, diện tích lúa gieo cấy sớm, tránh phun tràn lan, làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Tích cực tham gia đánh bắt chuột bằng các biện pháp như: Thủ công và hóa học đảm bảo an toàn và hiệu quả.

2. Trên cây nhãn vải và cây có múi

- Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn vải, cây có múi để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, rầy chổng cánh, bọ trĩ, sâu đục cuống, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc đặc hiệu tại nơi có sâu bệnh phát triển theo nguyên tắc 4 đúng.

- Phun phòng trừ bệnh sương mai bằng các thuốc đặc hiệu như: Ridomil Gold 68 WG, Jack M 9 72 WP, Amistar 250 SC…

- Phun trừ bọ xít nhãn, vải bằng các thuốc như: Dylan 2EC, Trebon 10EC…

- Rệp muội, sâu đo, bọ trĩ… phun trừ bằng các thuốc như: Movento 150OD, Kola700WG…

TRƯỞNG TRẠM

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI

Phạm Thị Thúy

Nơi nhận:
- Trung tâm Nước sạch,KTNN và BTTN(để b/c)
- Chi cục trồng trọt và BVTV (để b/c)
- UBND các xã
- Lưu: VT.

Được quét bằng CamScanner