TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI
Số: 04 /TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ân Thi, ngày 17 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH BẢO VỆ THỰC VẬT TỪ NGÀY 10/03 ĐẾN 17/03/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 17-25^{0}C

Độ ẩm trung bình: 70 - 80 %.

Tuần qua trời nắng ấm đêm và sáng có mưa nhỏ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Kế hoạch gieo cấy toàn khu vực là 6.300 ha.
- GĐST: Đẻ nhánh - Đẻ nhánh rộ.
- Cây nhãn, vải: Phát triển nụ, hoa.
- Cây có múi: Ra hoa - quả non.

II. TÌNH HÌNH BVTV 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên một số diện tích ở những chân ruộng gần kênh mương, mật độ phổ biến 0,5 -1 con/m^2, nơi cao 2-3 con/m^2. Cá biệt > 5 con/m2.
- Chuột gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, ven làng, gần gò đống kênh mương… Tỷ lệ phổ biến 0,5-1% số dảnh, nơi cao 3-5% số dảnh, cá biệt >10% số dảnh.
- Bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ phát triển cục bộ trên một số diện tích lúa muộn, cấy xong gặp rét, ruộng cạn nước…Tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số khóm, nơi cao >10% số khóm.
- Bệnh đạo ôn lá xuất hiện và phát triển trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp 415, Nếp 9603… cấy sớm. Tỷ lệ hại nơi cao 1% số lá. C1.
- Ngoài ra, bọ trĩ, rầy, rệp, cỏ dại phát triển trên lúa gieo thẳng, lúa cấy mạ sân, ruộng cạn nước …

2. Trên cây nhãn vải, cây có múi

- Trên cây nhãn vải: Nhện, bọ xít nâu, rầy chổng cánh, bệnh sương mai, thán thư … gây hại cục bộ trên một số diện tích.
- Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội gây hại rải rác mật độ thấp.

III/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa:

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại ở những chân ruộng trũng, gần kênh mương. Tập chung ở những diện tích lúa muộn.

Được quét bằng CamScanner

- Chuột gây tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, ven làng, gần gò đống kênh mương. Những nơi tổ chức diệt chuột kém hiệu quả…

- Bệnh nghẹt rễ tiếp tục phát triển ở những chân ruộng cạn nước hoặc bị ngộ độc hữu cơ, đất chua…

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên một số giống lúa nhiễm trà sớm. Chú ý những diện tích bón dư thừa phân đạm.

- Ngoài ra bọ trĩ, rệp muội, sâu năn, cỏ dại tiếp tục xuất hiện và phát triển trên một số diện tích lúa gieo thẳng, lúa cấy mạ sân.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

- Trên cây nhãn vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu gây hại cục bộ, bệnh sương mai, thán thư tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích.

- Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa:

Tăng cường kiểm tra ruộng, vườn theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng.

- Tiếp tục triển khai chiến dịch diệt chuột đợt 2 theo kế hoạch diệt chuột vụ Xuân 2026 đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tiếp tục hướng dẫn nông dân phun trừ thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm cho một số diện tích lúa đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Theo dõi và tập chung thu gom, hủy diệt ốc bươu vàng ở những nơi có mật độ cao có thể dung thuốc hóa học để phun trừ.

- Ruộng bị nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ: Cần xử lý bằng cách bổ xung thêm lân lâm thao hoặc rắc vôi bột với hàm lượng 15kg/sào, phun bổ sung phân bón qua lá, qua rễ. Với những chân ruộng có biểu hiện bị nghẹt rễ tuyệt đối dừng bón đạm, khi nào cây ra lá mới thì tiếp tục chăm bón bình thường.

- Điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối NPK, tỉa dặm những diện tích lúa bị chuột, ốc gây hại để cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi.

- Chủ động theo dõi tình hình sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân ở những diện tích lúa cấy sớm.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

- Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn vải, cây có múi từ khi ra hoa đến đậu quả non, chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ Xít, rệp muội, rầy chổng cánh, bọ trĩ, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc đặc hiệu tại nơi có sâu bệnh phát triển.

TRẠM TRƯỞNG

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI

Phạm Thị Thúy

Nơi nhận:
- Trung tâm Nước sạch,KTNN và BTTN(để b/c)
- Chi cục trồng trọt và BVTV (để b/c)
- UBND các xã
- Lưu: VT.

Được quét bằng CamScanner