TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI
Số: 16/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ân Thi, ngày 23 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(TỪ NGÀY 16/6 ĐẾN 23/6/2026)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 32 - 39^{0}C

Độ ẩm trung bình: 50-60%.

Tuần qua, ngày trời nắng nóng xen kẽ có mưa rào nhẹ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho công tác gieo cấy lúa mùa.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Kế hoạch gieo cấy toàn huyện là 5.908,46 ha.
- GĐST : - Mạ mới gieo - Đang cấy - Bén rễ hồi xanh.
- Cây nhãn: Phát triển quả.
- Cây có múi: phát triển quả.

II.NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác tập chung ở những chân ruộng trũng, ruộng gần kênh mương, mật độ phổ biến 0,5-1con/m^2, nơi cao 4-6 con/m^2, cá biệt >10 con/m^2.
- Chuột gây hại nhẹ cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, gieo xạ gần ven làng, gần gò đống kênh mương. Tỷ lệ phổ biến 0,1- 0,3% số dảnh, nơi cao 1-3% số dảnh.

2.Trên cây nhãn vải, cây có múi

- Trên cây nhãn:

+ Bệnh thán thư gây hại cục bộ tỷ lệ hại phổ biến 1-2% số quả, nơi cao 5% số quả.

+ Rệp sáp gây hại tỷ lệ phổ biến 0,5-1% số cành, nơi cao 3% số cành.

+ Sâu đo gây hại cục bộ mật độ phổ biến 1-3 con/m2, nơi cao 5-7 con/m2

- Trên cây có múi:

+ Sâu vẽ bùa: Gây hại cục bộ trên lộc non tỷ lệ 2-4% số lá, nơi cao 5-10% số lá.

+ Nhện đỏ, sâu hại lá: Tỷ lệ hại 1-2% số lá, nơi cao 5-7% số lá.

III/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa:

Được quét bằng CamScanner

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại ở những chân ruộng gần kênh mương.
- Chuột gây tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, gần ven làng, gần gò đống kênh mương.
- Bệnh nghẹt rễ xuất hiện ở một số diện tích, chủ yếu ở những chân ruộng gieo cấy vảo những ngày nắng nóng, ruộng cạn nước…
- Ngoài ra bọ trĩ, rầy rệp, sâu năn, cỏ dại... gây hại cục bộ trên một số diện tích lúa gieo thẳng.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

- Trên cây nhãn vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu gây hại cục bộ, bệnh sương mai, thán thư, nứt quả, thối quả...tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích.
- Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa:

- Khẩn trương làm đất, tập trung gieo cấy trong khung lịch thời vụ đã định của tỉnh.
- Tập trung thu gom, hủy diệt ốc bươu vàng ở những nơi có mật độ cao có thể dùng thuốc hóa học như: Robert 888WP, Ốc 750WP…. để phun trừ.
- Khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ trên lúa an toàn, hiệu quả bằng các thuốc có chứa hoạt chất an toàn, theo liều lượng, thời gian được khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.
- Tập trung đánh bắt chuột bằng mọi biện pháp hóa học và thủ công ở những nơi chuột gây hại ngay từ đầu vụ sản xuất.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

- Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn, cây có múi để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, rầy chổng cánh, bọ trĩ, sâu đục cuống, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc đặc hiệu tại nơi có sâu bệnh phát triển theo nguyên tắc 4 đúng.
- Phun phòng trừ bệnh sương mai bằng các thuốc đặc hiệu như: Ridomil Gold 68 WG, Jack M 9 72 WP, Amistar 250 SC…
- Phun trừ bọ xít nhãn, vải bằng các thuốc như: Dylan 2EC, Trebon 10EC…
- Rệp muội, sâu đo, bọ trĩ… phun trừ bằng các thuốc như: Movento 150OD, Kola700WG…

.

TRẠM TRƯỞNG

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI

Phạm Thị Thúy

Nơi nhận:
- Trung tâm Nước sạch,KTNN và BTTN(để b/c)
- Chi cục trồng trọt và BVTV (để b/c)
- UBND các xã
- Lưu: VT

Được quét bằng CamScanner