TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI
Số: 25/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ân Thi, ngày 25 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(TỪ NGÀY 18/8 ĐẾN 25/8/2026)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 27-33^{0}C

Độ ẩm trung bình: 75-80%.

Tuần qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn diện rộng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Kế hoạch gieo cấy toàn khu vực Ân Thi là 5.908,46 ha. Đến ngày 25/8/2026 diện tích lúa trỗ là: 1.050ha.
- GĐST : Làm đòng - Thấp tho trỗ.
- Cây nhãn: Thu hoạch.
- Cây có múi: Phát triển quả.

II.NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Mật độ phổ biến: 2-3 con/m^2, nơi cao: 5 con/m^2. T4,5,N.

+ Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây rải rác trên các trà lúa.

+ Chuột gây hại rải rác trên một số diện tích khu ruộng chân cao, gieo , cấy gần ven làng, gần gò đống kênh mương. Tỷ lệ phổ biến 0,3-0,5% số dảnh, cao 3 - 5% số dảnh, Cá biệt >10 % số dảnh.

+ Bệnh khô vằn phát sinh, phát triển trên các trà lúa, tập chung ở những chân ruộng xanh tốt, bón phân không cân đối NPK. Tỷ lệ hại phổ biến 5-10% số dảnh, cao 20-30% số dảnh, cá biệt >40% số dảnh. C1-3-5-7.

+ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Gây hại rải rác trên một số giống lúa nhiễm như: BTS7, T10, lúa lai các loại…đặc biệt sau những trận mưa giông. Tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, nơi cao 20% số lá, cá biệt >30 % số lá. C1-3-5.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Mật độ phổ biến 100 -200 con/m^2, nơi cao 700 con/m^2, cá biệt >1.000 con/m^2. T1,2, trứng, TT.

2.Trên cây nhãn vải, cây có múi

+Trên cây nhãn vải: Rệp sáp gây hại tỷ lệ phổ biến 0,5 – 1% số cành; nơi cao 3 – 5% số cành; sâu đo gây hại cục bộ trên lộc non tỷ lệ 1-3%, nơi cao 5-7% số lá;

+Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, nhện đỏ gây hại nơi cao 5- 7% số lá.

III/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa:

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu cuốn lá nhỏ bướm vũ hóa và đẻ trứng rải rác từ ngày 27/8 – 31/8/2026. Sâu non nở rộ từ ngày 2/9 -7/9/2026. Nếu không chủ động phun trừ sẽ gây sơ trắng lá đòng và lá kề đòng.

+ Sâu đục thân 2 chấm: Gây hại rải rác trên các trà lúa. Chú ý những diện

Được quét bằng CamScanner

tích đòng già thấp tho trỗ.

+ Bệnh khô vằn: tiếp tục phát sinh, phát triển trên các trà lúa.

+ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh, phát triển mạnh trên các giống lúa nhiễm sau những trận mưa giông.

+ Chuột tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích chủ yếu những ruộng ven làng, gần gò đống kênh mương.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gia tăng và tích lũy mật độ trên các giống lúa nhiễm.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

+ Trên cây nhãn vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu gây hại cục bộ, bệnh sương mai, thán thư, nứt quả, thối quả...tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích.

+ Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa:

Tăng cường kiểm tra ruộng vườn, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, rầy nâu, rầy lưng trắng….để có biện pháp xử lý kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng.

- Đối với những diện tích đang đòng già thấp tho trỗ cần chủ động phun phòng trừ sâu đục thân bằng các thuốc đặc hiệu sau: Vitako 40 WG, Voliam targo 063 SC, DuPonnt Prevathon 5 SC. Lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 sau khi lúa trỗ thoát hoàn toàn.

- Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Incipio 200 SC, Dylan 5 WG, Comdagold 5WG, Vitako 40 WG, Voliam targo 063 SC...**Thời gian phun trừ tập chung từ 2/9/2026 - 7/9/2026.**

- Rẽ lúa kiểm tra mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng và phun trừ kịp thời ở những nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Afta 300WG…

- Phun phòng trừ bệnh khô vằn bằng thuốc: Anvil 5SC, Tilsuper 300EC, Nevo 330 EC, Sagogarain 300EC…

- Phun phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cho các giống lúa nhiễm bằng thuốc đặc hiệu như: Ychatot 900SP, Totan 200WP, Xantocin 40WP, Xanthomix 20 WP...Sau những trận mưa giông.

2. Trên cây nhãn và có múi

+ Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn muộn, cây có múi để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, rầy chổng cánh, bọ trĩ, sâu đục cuống, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc đặc hiệu tại nơi có sâu bệnh phát triển theo nguyên tắc 4 đúng đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

+ Phun phòng trừ bệnh sương mai bằng các thuốc đặc hiệu như: Ridomil Gold 68 WG, Jack M 9 72 WP, Amistar 250 SC…

+ Phun trừ bọ xít nhãn, vải bằng các thuốc như: Dylan 2EC, Trebon 10EC…

Được quét bằng CamScanner

+ Rệp muội, sâu đo, bọ trĩ… phun trừ bằng các thuốc như: Movento 150OD, Kola700WG…

TRẠM TRƯỞNG

Phạm Thị Thúy

Nơi nhận:
- *UBND các xã / Để phối hợp*
- *Lưu VP*

Được quét bằng CamScanner