TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
CƠ SỞ ÂN THI
Số: 21 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ân Thi, ngày 28 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(TỪ NGÀY 21/7 ĐẾN 28/7/2026)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 30 - 35^{0}C

Độ ẩm trung bình: 65 -70%.

Tuần qua, ngày trời nắng nóng xen kẽ có mưa rào và giông. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Kế hoạch gieo cấy toàn huyện là 5.908,46 ha.
- GĐST : Đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh.
- Cây nhãn: Thu hoạch.
- Cây có múi: Phát triển quả.

II.NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

+Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non gây hại rải rác trên lúa chủ yếu ở những ruộng cấy sớm xanh tốt với mật độ thấp. Sâu non chủ yếu tuổi 3,4,5.

+ Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây hại rải rác mật độ thấp.

+ Chuột gây hại rải rác trên một số diện tích khu ruộng chân cao, gieo , cấy gần ven làng, gần gò đống kênh mương. Tỷ lệ phổ biến 0,1-0,3% số dảnh, cao 1-3% số dảnh, Cá biệt 5-10 % số dảnh.

+ Bệnh khô vằn xuất hiện trên trà sớm, ruộng xanh tốt bón phân không cân đối NPK. Tỷ lệ hại phổ biến 1-3% số dảnh, cao 10% số dảnh. C1-3.

+ Bệnh thối thân: Gây hại rải rác trên các khu ruộng trũng. Tỷ lệ hại phổ biến 0,5-1% số dảnh, nơi cao 5% số dảnh. C1.

2.Trên cây nhãn vải, cây có múi

+Trên cây nhãn vải: Bệnh thán thư gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 1- 2% số quả, nơi cao 5 – 7% số quả , ngoài ra rệp sáp, gây hại tỷ lệ phổ biến 0,5 – 1% số cành; nơi cao 3 – 5% số cành; sâu đo gây hại cục bộ trên lộc non tỷ lệ 1-3%, nơi cao 5-7% số lá;

+Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, nhện đỏ gây hại nơi cao 5- 7% số lá.

III/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây lúa:

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục gây hại rải rác ở những ruộng xanh tốt, cấy dày, bón nặng đạm.

+ Sâu đục thân 2 chấm: Gây hại rải rác trên trà lúa xanh tốt.

+ Bệnh khô vằn: tiếp tục phát sinh phát triển trên các trà lúa.

Được quét bằng CamScanner

+ Bệnh thối thân: tiếp tục phát triển trên những chân ruộng trũng, ruộng bón dư thừa đạm.

+ Chuốt tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích chủ yếu những ruộng ven làng, gần gò đồng kênh mương.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

+ Trên cây nhãn vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu gây hại cục bộ, bệnh sương mai, thán thư, nứt quả, thối quả...tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích.

+ Trên cây có múi: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa:

Tăng cường kiểm tra ruộng vườn, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng.

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm: Cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

+ Phun phòng trừ bệnh khô vằn bằng các thuốc như: Anvil 5SC, Tilsuper 300EC, Nevo 330EC...

+ Tập trung đánh bắt chuột bằng mọi biện pháp hóa học và thủ công ở những nơi chuột còn gây hại.

2. Trên cây nhãn vải và có múi

+ Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn, cây có múi để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, rầy chổng cánh, bọ trĩ, sâu đục cuống, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc đặc hiệu tại nơi có sâu bệnh phát triển theo nguyên tắc 4 đúng đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

+ Phun phòng trừ bệnh sương mai bằng các thuốc đặc hiệu như: Ridomil Gold 68 WG, Jack M 9 72 WP, Amistar 250 SC…

+ Phun trừ bọ xít nhãn, vải bằng các thuốc như: Dylan 2EC, Trebon 10EC…

+ Rệp muội, sâu đo, bọ trĩ… phun trừ bằng các thuốc như: Movento 150OD, Kola700WG…

TRẠM TRƯỞNG

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ ÂN THI

Phạm Thị Thúy

Nơi nhận:
- Trung tâm Nước sạch,KTNN và BTTN(để b/c)
- Chi cục trồng trọt và BVTV (để b/c)
- UBND các xã
- Lưu: VT

Được quét bằng CamScanner